

Αναμνηστική δόση εμβολίου κατά του covid 19

Οδηγίες για τον εμβολιασμό με την αναμνηστική δόση



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Οδηγίες για τον γενικό πληθυσμό:



Όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών έχουν το δικαίωμα στην αναμνηστική δόση. Πιο συγκεκριμένα,

- Για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλια Pfizer, Moderna ή AstraZeneca, η αναμνηστική δόση θα είναι με εμβόλιο Pfizer ή μισή δόση Moderna, μετά από 3 μήνες.
- Για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο Johnson & Johnson, η αναμνηστική δόση θα πραγματοποιείται με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, Pfizer ή μισή δόση Moderna εμβόλιο, μετά από 2 μήνες.
- Για τα άτομα που έκαναν πρώτη δόση με εμβόλιο Pfizer ή Moderna και δεύτερη δόση με Johnson & Johnson, δε συστήνεται να πραγματοποιήσουν αναμνηστική δόση.

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας για την αναμνηστική δόση, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε για την πρώτη και την δεύτερη δόση.

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση



Περίπτωση 1^η



Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 2 δόσεις
Pfizer, Moderna ή AstraZeneca

Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 3
μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μισή δόση
Moderna

Περίπτωση 2^η




Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 1
δόση J&J


Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 2
μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή
δόση Moderna

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση

Περίπτωση 3^η



1^η δόση με εμβόλιο Pfizer,
Moderna ή Astra Zeneca



2^η δόση με εμβόλιο J&J




Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού
δε συστήνει τον εμβολιασμό με
αναμνηστική δόση.

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση


Περίπτωση 1^η



Νόσηση πριν τον
εμβολιασμό




1 δόση εμβολίου J&J




Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση
τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία δόση Pfizer,
J&J ή μισή δόση Moderna


Περίπτωση 2^η



Νόσηση πριν τον
εμβολιασμό



Εμβολιασμός με Pfizer,
Moderna ή AstraZeneca




Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση
τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή
μισή δόση Moderna

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση


Περίπτωση 3^η




1^η δόση με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca



Νόσηση μετά την 1^η δόση εμβολιασμό




Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) για ολοκλήρωση του εμβολιασμού




Αναμνηστική δόση συστήνεται 3 μήνες μετά από τη 2^η δόση με 1 δόση Pfizer ή Moderna μισή δόση


Περίπτωση 4^η



Ολοκλήρωση εμβολιασμού με J&J






Νόσηση μετά τον εμβολιασμό



Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 5^η



Ολοκλήρωση εμβολιασμού με 2
δόσεις Pfizer, Moderna ή
AstraZeneca

Νόσηση μετά τον
εμβολιασμό

Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες
μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer
ή μισή δόση Moderna



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού